

Foto's: DirkJan en Kirsten Dekker
Tekst: DirkJan Dekker

Neeltje Jans, halverwege de de Oosterschelddedam.

Vlag 1: De wierenpoelen.

Vlag 2: De zuidelijke dam van de binnenhaven. Dit was een beschutte plek voor de lunch, de dijk stond vol met Zeevenkel.

Vlag 3: De zuidelijke dam van de buitenhaven, waarop voornamelijk Knotswier groeit.

Het was op maandag 19 augustus 2019 laag water om 10:53 uur, de excursie begon om 10:00 uur, en duurde tot ongeveer 13:00 uur.

Er woei een harde ZW wind, droog weer, 18°C.

Bij vlag 1

De dam ligt heel laag, bij eb is hij te betreden, maar er liggen verscheidene poelen in de dam.

Veelal worden stenen gekeerd, er zijn bijzondere vondsten te doen. Wij waren echter voornamelijk geïnteresseerd in de poelen waar wieren in groeien.

De grote poel, omringd door de dam, is zeker een paar meter diep. Bij rustig weer met weinig golven kan tot op de bodem gekeken worden. Wij konden ondanks de harde wind net zien dat langs de rand veel Zeesla groeide...



De heremietkreeftenpoel



De eerste poel in de dam bevatte nogal wat “raceslakken”. Het is een vreemd gezicht: snel verplaatsende slakkenhuisjes. Het bleken Kleine heremietkreeften te zijn. Doorgaans zijn ze langs de waterkant op het strand te vinden.

Ze maken niet zelf een huisje, maar gebruiken lege slakkenhuisjes van Tepelhorens, Alikruiken, enz. Als het lichaam niet meer in een huisje past, wordt een groter leeg huisje gezocht.



Te herkennen is de ene grote schaar die ze hebben (grootte huisje 2.5 cm)



Apart in een bakje gezet, om ze beter te kunnen bekijken


Gevonden in de andere kleine poelen



Navelwier. De doorzichtige bladen vormen een rozetje, uitkomend op één hechtpunt (10 cm)




Stompe alikruik, klein.
Kan slecht tegen droogvallen, zit vaak onder
Gezaagde zee-eik (1 cm)



Een groepje Blauwe zeespringstaartjes
(grootte groepje 4 cm)



Idem, detail



Slijmerige drakentong (onderwater foto)
(15 cm)



Slingerzakpijp, gele vorm, kolonievormend
Een aantal individuen heeft zich gegroepeerd
rondom een centrale uitstroomopening (5 cm)



Japans bessenwier, onderwater foto, jong, nog
geen besjes (15 cm)



Een geleiwier, afwijkend van Vlak geleiwier
Lastige groep, met verschillende
verschijningsvormen per soort (4 cm)




Iriserend kraakbeenwier, in dit geval niet iriserend (2.5 cm)



Idem, detail



Rood hoorntjeswier (3 cm)



Idem, detail



Kolonie mosdiertjes (2 cm)



Mosdiertjes groeien over Japans bessenwier heen



Kolonie Hydropoliepen, ieder "flesje" bevat een poliepje (4 cm)



Gaffelwier (6 cm)



Zeesla (3 cm)



lers mos met Puntig korstmoswier (3 cm)



Slijmerige drakentong (25 cm)



Japans bessenwier (20 cm)



Rood horentjeswier (2 cm)



Knoopwier (15 cm)



Hydropoliep op Knotswier (Knots 3 cm)



Detail

Bij vlag 2

Lunch aan de beschutte kant van de zuidelijke dam van de binnenhaven.

De dijk bleek volop begroeid te zijn met Zeevenkel.



Bij vlag 3

De zuidelijke dam van de buitenhaven.
Op tamelijk beschutte dijken groeit doorgaans Knotswier.

Het kleine roodwier *Vertebrata lanosa* (Klein buiswier, Rond buiswier) groeit bij voorkeur op Knotswier. Vroeger kwam dat Rond buiswier veel voor in Nederland, maar tegenwoordig niet meer. De uitdaging was dus: kunnen wij nog Rond buiswier terugvinden?

Helaas, niets gevonden.

Hoe zou Rond buiswier op Knotswier eruit zien?
Zie onderstaand voorbeeld, gefotografeerd op 30 juni 2017, Glen Brittle, Skye, Scotland

