

Tekst en foto's: DirkJan Dekker

Tuttelhoekje, Tholen, ten zuiden van Scherpenisse aan de Oosterschelde.

Merkwaardige naam: Tuttelhoekje.

Dat deed me denken aan tuttelen, getuttel, tut (zeur), tuthola (trut).

Helemaal fout. Tuttel komt van tuit (puntig, spits, puntzakje), denk aan de mond tuiten.

Dus Tuttelhoekje kan komen van Tuitehoekje, de dijk vlakbij steekt scherp de zee in.

Over het kaartje:

Vlag 1: Parkeren.

Vlag 2: Tuttelhoekje, 500 meter lopen vanaf de parkeerplaats.



Het was op woensdag 11 september 2019 laag water om 08:45 uur, de excursie begon om 08:15 uur en duurde tot ongeveer 10:00 uur.

Er woei een flinke zuiden wind bij een temperatuur van 16°C.

Halverwege de excursie kwam daar motregen bij.



De dijk in de bocht van het Tuttelhoekje bestaat uit basaltblokken. Er ligt een strandje met veel aanspoelsel en met aan weerszijden van het strandje veel te keren stenen. Dat zijn dankbare schuilplaatsen voor allerlei krabben en dergelijke.

Prachtig is te zien op welk getijniveau verschillende wieren zich thuisvoelen.

Van hoog naar laag: Kleine zee-eik, Blaaswier, Gezaagde zee-eik, met tenslotte roodwiertjes op het laagste niveau onder water.



In de aanspoelsellagen zijn veel Stompe alikruiken te vinden.




Deze gele alikruiken zoeken beschutting op Gezaagde zee-eiken, omdat ze slecht tegen droogvallen kunnen. Met een stevige wind en golfbeweging spoelen ze af van de Gezaagde zee-eiken, en zijn dan hogerop tussen de schelpen te vinden.

Gevonden op het strand en tussen en onder de stenen



Schelpkokerworm (4 cm)



Stekelhoren (3 cm) en Ruwe alikruik (2 cm)



Stekelhoren (2 cm) en Paardeanemoon (4 cm)



Ruig krabbetje (3 cm)



Hooiwagenkrab (3 cm)



Schaalhoren (4 cm)



Keverslak (2 cm)



Penseelkrab (2 cm)

Het dijkgedeelte ten oosten van het strandje is over het gehele getij bedekt met een mozaïk van de groenwieren Zeesla en Darmwier, het bruinwier Kleine zee-eik en de roodwieren Knoopwier (donker) en Puntig korstmoswier (rood). Dit laatste wier kan heel goed tegen droogvallen, in tegenstelling tot de meeste roodwieren die te vinden zijn op de laagwaterlijn en lager.



Impressie aan de rand van het strandje bij laag water, met diverse donkere aangespoelde roodwieren.

In het water gevonden wieren



Stijf priemwier (12 cm, *Agardhiella subulata*), gehecht op een steentje (2 cm).

De hechtschijfjes van het Stijf priemwier op het steentje.



Knoopwier (12 cm, *Gracilaria gracilis*), een bijna zwart roodwier. De “knoopjes”, waaraan dit wier zijn naam te danken heeft, zijn half bolvormige voortplantingsorgaantjes, zittend op de takjes. In dit geval zijn er geen knoopjes te zien.



Rood hoorntjeswier (7cm, *Ceramium virgatum*)



Rood hoorntjeswier, detail van het linker gedeelte



Dit struikje (5 cm) bevat Rood hoorntjeswier, Fijn buiswier, Donker buiswier en heel veel zeer kleine roodwiertjes op de takjes van het Fijn buiswier.
Voor details zie de volgende bladzijde.



Donker buiswier (*Polysiphonia fucoides*)
16 pericellen rondom de kerncel zijn nog
weinig gekleurd op jonge takjes (pericellen op
oudere takjes zijn veel donkerder), met op de
achtergrond Rood hoorntjeswier



Fijn buiswier (*Polysiphonia stricta*)
4 pericellen rondom de kerncel zijn bijna niet
gekleurd

Darmwiertjes (5 cm, *Enteromorpha* sp)



Plukje zeesla (5 cm, *Ulva lactuca*)





Struikje Donker buiswier
(9 cm, *Polysiphonia fucoides*)



Struikje Donker buiswier, detail



Iriserend kraakbeenwier
(6 cm, *Chondria coerulescens*)
Een niet-iriserend exemplaar



Iriserend kraakbeenwier
Botte taktopjes, blaadjes zijn versmald bij de
aanhechting op de takjes